


Stabilis



Ciprofloxacin hydrochloride



Stabilité des préparations

		1000 mg ® = ?	SyrSpend SF® >> 20 ml	25°C		90		4198
		1000 mg ® = ?	SyrSpend SF® >> 20 ml	4°C		90		4198
		3000 mg Ciflox®	OraPlus® / sirop simple (1:1) >> 60 ml	24-26°C		56		1740
		3000 mg ®=? (Bayer)	OraPlus® / sirop simple (1:1) >> 60 ml	24-26°C		56		2676
		3000 mg ®=? (Bayer)	OraPlus® / sirop simple (1:1) >> 60 ml	3-5°C		56		2676
		3000 mg Ciflox®	OraPlus® / sirop simple (1:1) >> 60 ml	4-8°C		56		1740
























Bibliographie

	Type	Source
1740	Revue	Johnson CE, Wong D, Hoppe HL, Bhatt-Mehta V. Stability of ciprofloxacin in an extemporaneous oral liquid dosage form. Int J Pharm Compound 1998 ; 2, 4: 314-317.
2676	Revue	Johnson C.E, Wong D.V, Hoppe H.L, Bhatt-Mehta V. Stability of ciprofloxacin in an extemporaneous oral liquid dosage form. Int J Pharm Compound 1998 ; 2: 314-317.
4198	Revue	Uriel M, Gomez-Rincon C, Marro D. Stability of regularly prescribed oral liquids formulated with SyrSpend® SF. Pharmazie 2018 73;196-201



Dictionnaire

 Antibiotique	 Solution buvable
 Stabilité des préparations	 Contenant
 Origine	 Excipient
 Température	 Conservation
 Durée de stabilité	 Biosimilaire
 Données conflictuelles	 Bibliographie
 Verre	 Poudre
 Non précisée	 Jour
 Flacon plastique	 Comprimés
 A l'abri de la lumière	 Bibliographie
 Dictionnaire	