


Stabilis



Colistin sulfate



Stabilité en mélange

	POH benzoate de methyle 9,5 mg POH benzoate de propyle 3 mg Benzoate de sodium 10 mg Métabisulfite de sodium 7,5 mg NaHPO4 132,8 mg KCl 29,4 mg Na2HPO4 52, mg Eau purifiée >> 10 ml Ampho-Moronal® 5 ml	2-8°C		Amphotericin B : Poudre @ = ? 500 mg Tobramycin sulfate : Poudre @ = ? 121,75 mg	 180	 3685


















Bibliographie

	Type	Source
3685	Revue	Pfeifer C, Noll S, Gerecke H, Fassauer G, Jira T, Remane Y , Vogel J, Frontini R, Reinhardt R. A stability study of amphotericin B, colistin and tobramycin in a hydrophilic suspension commonly used for selective decontamination of the digestive tract by HPLC and in vitro potency measurements. EJHP 2017 ; 24:4 : 235-241



Dictionnaire

 Antibiotique	 Solution buvable
 Stabilité en mélange	 Contenant
 Excipient	 Température
 Conservation	 Molécule
 Durée de stabilité	 Bibliographie
 Flacon plastique	 A l'abri de la lumière
 Jour	 Bibliographie
 Dictionnaire	