


Stabilis



Fumagillin



Stabilité des préparations

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|----|--|--|------|
| | | | | | | | | |
| | | 120mg Fumidil® NaCl 0.9% 20ml Dacriose® 20ml | 4°C | | 14 | | | 2382 |



Facteur influençant la stabilité

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | | | 2382 |
| | | | | 2382 |


























Bibliographie

| | Type | Source |
|------|-------|--|
| 2382 | Revue | Abdel-Rahman SM, Nahata MC. Stability of fumagillin in an extemporaneously prepared ophthalmic solution Am J Health-Syst Pharm 1999 ; 56: 547-550. |



Dictionnaire

| | |
|--|---|
|  Antifongique |  Collyre |
|  Stabilité des préparations |  Contenant |
|  Origine |  Excipient |
|  Température |  Conservation |
|  Durée de stabilité |  Biosimilaire |
|  Données conflictuelles |  Bibliographie |
|  Flacon plastique |  Poudre |
|  A l'abri de la lumière |  Jour |
|  Facteur influençant la stabilité |  Lumière |
|  Provoque |  Dégradation |
|  Augmentation |  Bibliographie |
|  Dictionnaire | |