


Stabilis



Terbinafine



Stabilité des préparations

 500 mg Lamisil®		OraPlus® 10 ml Orasweet® 10 ml	25°C	?	42			2417
 500 mg Lamisil®		OraPlus® 10 ml Orasweet® 10 ml	4°C	?	42			2417
 3750 mg ® = ? (Fagron)		SyrSpend SF PH4® >> 150 ml	2-8°C		90			3846
 3750 mg ® = ? (Fagron)		SyrSpend SF PH4® >> 150 ml	20-25°C		90			3846



















Bibliographie

	Type	Source
2417	Revue	Abdel-Rahman SM, Nahata MC. Stability of terbinafine hydrochloride in an extemporaneously prepared oral suspension at 25 and 4 degrees C Am J Health-Syst Pharm 1999 ; 56: 243-245.
3846	Revue	Polonini HC, Silva SL, Cunha CN, Brand?o MAF, Ferreira AO. Compatibility of cholecalciferol, haloperidol, imipramine hydrochloride, levodopa/carbidopa, lorazepam, minocycline hydrochloride, tacrolimus monohydrate, terbinafine, tramadol hydrochloride and valsartan in SyrSpend® SF PH4 oral suspensions. Pharmazie 2016 71: 185?191.



Dictionnaire

 Antifongique	 Solution buvable
 Stabilité des préparations	 Contenant
 Origine	 Excipient
 Température	 Conservation
 Durée de stabilité	 Biosimilaire
 Données conflictuelles	 Bibliographie
 Polyéthylène	 Comprimés
 Non précisée	 Jour
 Flacon plastique	 Poudre
 A l'abri de la lumière	 Bibliographie
 Dictionnaire	