


Stabilis



Triamcinolone



Stabilité des préparations

		0.1 g Triamcinolone	30°C					2786
		Menthol 0.05 g Ethanol 10 ml Propylène Glycol 30 ml Glycérine 20 ml Sorbitol 70% 20 ml Saccharinate de sodium 0.1 g Métabisulfite de sodium 0.02 g Edétate de sodium 0.1 g Eau purifiée 5 ml Sorbitol 70% >> 100 ml			1054			



Facteur influençant la stabilité

				2786
--	--	--	--	------

























Bibliographie

	Type	Source
2786	Revue	Ungphaiboon S, Nittayananta W, Vuddhakul V, Maneenuan D, Kietthubthew S, Wongpoowarak W, Phadoongsombat N. Formulation and efficacy of triamcinolone acetonide mouthwash for treating oral lichen planus. Am J Health-Syst Pharm 2005 ; 62, 5: 485-491.



Dictionnaire

 Antiinflammatoire	 Solution buvable
 Stabilité des préparations	 Contenant
 Origine	 Excipient
 Température	 Conservation
 Durée de stabilité	 Biosimilaire
 Données conflictuelles	 Bibliographie
 Verre	 Poudre
 A l'abri de la lumière	 Jour
 Facteur influençant la stabilité	 Augmentation
 Provoque	 Dégradation
 Bibliographie	 Dictionnaire